



# PILARIX

## Krem zapobiegający nadmiernemu rogowaceniu skóry

PILARIX krem to nowoczesny preparat skutecznie zapobiegający nadmiernemu rogowaceniu skóry. Poprzez zwiększenie nawilżenia warstwy rogowej naskórka przyspiesza procesy regeneracji skóry w przebiegu wielu dermatoz, działa przeciwzapalnie.

### PILARIX krem zawiera:

- kwas salicylowy 2 % - ułatwia oddzielanie się nawarstwionych rogowaceń naskórka
- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka
- panthenol - działa kojąco, przeciwzapalnie w przypadkach podrażnień, niezależnie od przyczyny
- alantoinę - przyspiesza regenerację skóry chorobowo zmienionej, podrażnionej, biologicznie uszkodzonej
- masło shea

### PILARIX krem wskazania:

- rogowacenie okołomieszkowe
- wyprysk w fazie nadmiernego łuszczenia
- przewlekła suchość skóry
- jako środek przyspieszający regenerację skóry między okresami sterydoterapii zewnętrznej
- po depilacji mechanicznej

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki kremu, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia, niewydolność nerek lub wątroby. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

### PILARIX krem sposób użycia:

Stosować 2 x dziennie lub według wskazań lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

### Dostępne opakowanie:

PILARIX krem

- tuba o zawartości 100 ml
- tuba o zawartości 50 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



# SQUAMAX

## Emulsja do złuszczenia nadmiernie zrogowaciałej skóry

SQUAMAX emulsja to pierwszy preparat zawierający łącznie kwas salicylowy i mocznik, przeznaczony do leczenia zaburzeń rogowacenia skóry w przebiegu wielu chorób dermatologicznych. Skutecznie usuwa nadmierne rogowacenie, ułatwiając oddziaływanie innych leków. Jest niezwykle komfortowy w zastosowaniu: nie powoduje nadmiernego przetłuszczenia, łatwo zmywalny wodą z dodatkiem szamponu lub mydła.

### SQUAMAX emulsja zawiera:

- kwas salicylowy 5% - zapewnia działanie złuszczące
- pogrubiałej warstwy rogowej naskórka
- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność
- warstwy rogowej naskórka
- substancje pomocnicze - stabilizują właściwe natłuszczenie i nawilżenie skóry

### SQUAMAX emulsja wskazania:

- łuszczyca
- łupież
- łojotokowe zapalenie skóry w fazie nadmiernego
- łuszczenia
- wyprysk z hyperkeratozą

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas salicylowy lub pozostałe składniki emulsji, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia, niewydolność nerek lub wątroby. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

### SQUAMAX emulsja sposób użycia:

Nakładać na suchą skórę 1 raz dziennie na 2-4 godziny. Po zmyciu ciepłą wodą z dodatkiem szamponu lub mydła można stosować inne preparaty. Zabieg powtarzać przez kilka dni. Sposób użycia może być modyfikowany przez lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

### Dostępne opakowanie:

SQUAMAX emulsja - tuba o zawartości 200 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## URO

### Krem przeciw nadmiernej potliwości stóp

#### **Właściwości i działanie:**

Krem przeciw nadmiernej potliwości stóp działa hamująco na sekrecję gruczołów potowych oraz grzybobójczo. Zawarta urotropina oraz chlorowodorotlenek glinu zmniejszają wydzielanie potu, przywracając uczucie świeżości i komfortu. Clotrimazol ogranicza rozwój drożdżaków, często obecnych na skórze w przypadku nadmiernej potliwości.

#### **Wskazania:**

Nadmierna potliwość stóp

#### **Przeciwwskazania:**

Ciąża, okres karmienia piersią. Wiek poniżej 12 roku życia. Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby, nerek i z zaburzeniami krążenia w obrębie kończyn dolnych. Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### **Zastosowanie:**

Krem nakładać 1 raz dziennie na całą powierzchnię stóp. Po kilku minutach założyć bawełniane skarpetki. Krem powinien pozostać na skórze przez 3-7 godzin, następnie należy go zmyć wodą z dodatkiem mydła. Kurację należy powtarzać do momentu ustąpienia nadmiernej potliwości, zwykle przez 2-4 dni. W przypadku wystąpienia nadmiernego przesuszenia skóry należy zastosować krem nawilżający przez kilka następnych dni.

Uwaga: W trakcie stosowania kremu należy obserwować proces ustępowania objawów nadmiernej potliwości i w odpowiednim momencie zakończyć stosowanie preparatu. Zbyt długie stosowanie kremu może spowodować nadmierną suchość, rogowacenie i łuszczenie skóry.

#### **Dostępne opakowanie:**

URO krem przeciw nadmiernej potliwości stóp - tuba 30ml.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## ACNE MAT

### Matujący krem przeciwtrądzikowy

#### Właściwości i działanie:

Krem przeciwtrądzikowy ACNE MAT działa przeciwbakteryjnie i matująco. Zawarte substancje przeciwbakteryjne (chlorquinaldol) oraz matujące pozwalają jednocześnie zmniejszać ilość wykwitów trądzikowych i poprawić wyraz estetyczny skóry poprzez zmniejszenie efektu łojotokowego przetłuszczenia. Zawarty chlorquinaldol to pochodna 8-hydroksychinoliny mająca działanie przeciwbakteryjne (gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae). Działa również na pierwotniaki i niektóre grzyby (*C. albicans*).

#### Wskazania:

Trądzik pospolity z nadmiernym przetłuszczeniem skóry.

#### Przeciwwskazania:

Ciąża, okres karmienia piersią.

Wiek poniżej 12 roku życia.

Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### Zastosowanie:

Niewielką ilość kremu nakładać 2 razy dziennie na czystą skórę. W przypadku wcześniejszego umycia skóry zaleca się okres 20 minut przerwy przed zastosowaniem kremu.

#### Dostępne opakowanie:

ACNE MAT krem tuba o zawartości 30 ml.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## ACNE WIN

### Przeciwtrądzikowy krem na chłodne dni

#### **Właściwości i działanie:**

Krem przeciwtrądzikowy ACNE WIN działa przeciobakteryjnie, a specjalna formuła podłoża zapewnia bezpieczne jego stosowanie w obniżonej temperaturze otoczenia. Zawarty chlorquinaldol, to pochodna 8-hydroksychinoliny mająca działanie przeciobakteryjne (gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae). Działa również na pierwotniaki i niektóre grzyby (*C. albicans*).

#### **Wskazania:**

Trądzik pospolity

#### **Przeciwwskazania:**

Ciąża, okres karmienia piersią.

Wiek poniżej 12 roku życia.

Nie stosować kremu na uszkodzoną skórę, błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### **Zastosowanie:**

Niewielką ilość kremu nakładać 2 razy dziennie na czystą skórę. W przypadku wcześniejszego umycia skóry zaleca się okres 20 minut przerwy przed zastosowaniem kremu. Ekspozycja na obniżoną temperaturę otoczenia może nastąpić po upływie 20 minut od wchłonięcia się kremu po jego nałożeniu na skórę.

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### **Dostępne opakowanie:**

ACNE WIN krem tuba o zawartości 20 ml.



## SEBOTON

### Matujący krem przeciwgrzybiczy

#### Właściwości i działanie:

Krem przeciwgrzybiczy, w tym przeciwdrożdżakowy (np. *Malassezia furfur*), zawierający klotrimazol oraz substancje matujące pozwala efektywnie przeciwdziałać nadmiernemu przetłuszczaniu się skóry oraz łojotokowemu zapaleniu skóry. Znajduje również zastosowanie w przypadku grzybic powierzchniowych skóry.

#### Wskazania:

Nadmierne przetłuszczanie się skóry, łojotokowe zapalenie skóry, grzybice powierzchniowe skóry.

#### Przeciwwskazania:

Ciąża, okres karmienia piersią.

Wiek poniżej 12 roku życia.

Nie stosować kremu uszkodzoną skórę oraz na błony śluzowe.

Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby i nerek.

Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować bez konsultacji z lekarzem w przypadku występowania cukrzycy, zakażenia wirusem HIV, leczenia immunosupresyjnego, stosowania chemioterapii oraz w podeszłym wieku.

Wcześniejszej konsultacji z lekarzem wymaga stosowanie kremu Seboton równocześnie z jakimikolwiek lekami.

#### Zastosowanie:

Krem należy stosować 2 x dziennie na czystą, suchą skórę, co najmniej przez 4 tygodnie w celu uniknięcia ponownego wystąpienia zmian skórnych. W przypadku braku poprawy stanu skóry po 10 dniach stosowania kremu lub nasilenia objawów mimo stosowania kremu, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować kremu bez konsultacji lekarskiej w przypadku ponownego wystąpienia zmian skórnych.

#### Dostępne opakowanie:

Seboton krem tuba 20 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## CAPITIS DUO

### Szampon przeciwłupieżowy i przeciwłojotokowy

#### Właściwości i działanie:

CAPITIS DUO jest szamponem o działaniu przeciwłupieżowym oraz przeciwgrzybiczym. Zakres skuteczności działania szamponu powiększono dzięki zawartości dwóch substancji o działaniu przeciwgrzybiczym (ketokonazol oraz siarczek selenu).

#### Wskazania:

łupież skóry głowy, łojotokowe zapalenie skóry głowy, łupież pstry -wspomagająco.

#### Przeciwwskazania:

Ciąża, okres karmienia piersią.

Wiek poniżej 12 roku życia.

Nie stosować szamponu na podrażnioną lub uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe.

Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby lub nerek.

Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### Zastosowanie:

Szampon, w przypadku łupieżu lub łojotokowego zapalenia skóry głowy należy stosować codziennie przez 7-10 dni a następnie 2 x w tygodniu przez 3 tygodnie. W przypadku łupieżu pstrego, w celu eliminacji zakażenia w obrębie skóry owłosionej głowy, szampon należy stosować przez 7-10 dni a następnie przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach. Nakładać na zwilżone włosy, równomiernie rozprowadzić na całej powierzchni skóry głowy. Pozostawić na skórze przez 5 minut i spłukać wodą.

#### Dostępne opakowanie:

Capitis Duo szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy

- butelka o zawartości 110 ml
- saszetki 6\*6ml
- saszetki 25\*5ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## VERSIC

### Emulsja przeciwgrzybiczo-złuszczająca

#### **Właściwości i działanie:**

VERSIC dzięki zawartości ketokonazolu oraz rezorcyny działa przeciwgrzybiczo i złuszczająco. Równoczesne zastosowanie substancji hamującej rozwój zakażenia grzybiczego ze składnikiem powodującym powierzchowną eksfoliację zwiększa szybkość i skuteczność działania preparatu. Nowoczesna formuła emulsji pozwala ją stosować z zachowaniem wysokiego komfortu użycia.

#### **Wskazania:**

Łupież pstry, powierzchowne grzybice skóry wymagające równoczesnej powierzchniowej eksfoliacji.

#### **Przeciwwskazania:**

Ciąża, okres karmienia piersią.

Wiek poniżej 12 roku życia.

Nie stosować emulsji na uszkodzoną skórę, na błony śluzowe oraz okolice moczowo-płciowe.

Nie stosować u osób z niewydolnością wątroby i nerek.

Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

#### **Zastosowanie:**

Emulsję stosować 2 razy dziennie (rano i wieczorem) przez 7-10 dni. W przypadku łupieżu pstrego wskazane jest równoczesne zastosowanie szamponu zawierającego ketokonazol do mycia głowy (codziennie przez 7-10 dni) oraz powtórzenie aplikacji (VERSIC + szampon) przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach. Takie postępowanie zmniejsza szansę ponownego wystąpienia objawów łupieżu pstrego. Jeśli łupież pstry występował w postaci jasnych plam na skórze, objaw ten nie będzie zanikał w trakcie stosowania preparatu. Jasne plamy ustąpią w trakcie naturalnego procesu opalania skóry po zakończeniu stosowania preparatu. W trakcie stosowania preparatu oraz przez następne 5 dni nie należy eksponować skóry na promienie UV (słoneczne, solarium).

Uwaga: Po otwarciu opakowania preparat może stopniowo zmienić barwę na ciemniejszą (kontakt ze światłem i powietrzem). Zmiana barwy pozostaje bez wpływu na wartość użytkową preparatu.

#### **Dostępne opakowanie:**

VERSIC emulsja przeciwgrzybiczo-złuszczająca butelka o zawartości 110 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.





## VERSIC SET (VERSIC + CAPITIS DUO)

Zestaw zawierający **Versic** (emulsję przeciwgrzybiczo-złuszczającą) oraz **Capitis Duo** (szampon przeciwłupieżowy i przeciwgrzybiczy) zapewnia kompleksowe rozwiązanie w walce z łupieżem pstrym.

Versic - emulsja przeznaczona jest do eliminacji objawów łupieżu pstrego w obrębie skóry gładkiej (zazwyczaj tułowia) a szampon, Capitis Duo, zabezpiecza przed pozostawieniem utajonego zakażenia w obrębie owłosionej skóry głowy. Równoczesne zastosowanie obu preparatów zmniejsza szansę ponownego wystąpienia objawów łupieżu pstrego.

### **Sposób użycia w przypadku łupieżu pstrego:**

**Versic** - emulsję należy stosować 2 x dziennie

(rano i wieczorem) przez 7-10 dni a następnie przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach.

**Capitis Duo** - szampon należy stosować 1 x dziennie przez 7-10 dni a następnie przez 4 kolejne dni po miesiącu i dwóch miesiącach.

### **Dostępne opakowanie:**

Versic emulsja i Capitis Duo szampon 2 x 110 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## CANDI

### Pomadka na pękające kąćki ust

#### **Właściwości i działanie:**

Pomadka CANDI działa przeciwbakteryjnie i przeciwdrożdżakowo. Zawarty chlorquinaldol to pochodna 8-hydroksychinoliny mająca działanie przeciwbakteryjne (gronkowce, paciorkowce, pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae). Działa również na pierwotniaki i niektóre grzyby (*C. albicans*). Klotrimazol ma działanie przeciwdrożdżakowe.

#### **Wskazania:**

Pękające kąćki ust.

#### **Przeciwwskazania:**

Ciąża, okres karmienia piersią.

Wiek poniżej 12 roku życia.

Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować bez konsultacji z lekarzem w przypadku występowania cukrzycy, kiły, zakażenia wirusem HIV, leczenia immunosupresyjnego, stosowania chemioterapii oraz w podeszłym wieku.

Pomadka przeznaczona jest do stosowania wyłącznie zewnętrznego, tylko w obrębie kąćków ust.

Nie stosować w przypadku opryszczki. Nie połykać.

#### **Zastosowanie:**

Niewielką ilość pomadki nakładać na zmienione kąćki ust 3 razy dziennie. Stosować do czasu ustąpienia zmian oraz przez 3 następne dni. W przypadku nieustąpienia zmian przez 3 dni, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku ponownego wystąpienia zmian nie należy stosować pomadki lecz zasięgnąć porady lekarza. Pomadka powinna być stosowana przez jedną osobę. Po ustąpieniu zmian pomadkę należy wyrzucić - nie wolno stosować ponownie ze względu na możliwość przeniesienia bakterii i drożdżaków. Podczas pierwszego zastosowania może wystąpić uczucie "pieczenia", które powinno ustąpić w ciągu ok. 15 minut. W trakcie stosowania preparatu unikać nasłonecznienia. Nie korzystać z solarium.

#### **Dostępne opakowanie:**

CANDI pomadka tuba o zawartości 5 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## RILLO

### Emulsja zapobiegająca nadmiernej potliwości

#### **Właściwości i działanie:**

Emulsja Rillo zapobiega nadmiernej potliwości w obrębie pach. Zastosowane składniki skutecznie redukują wydzielanie potu oraz pozwalają ograniczyć częstotliwość stosowania preparatu do niezbędnego minimum.

#### **Wskazania:**

Nadmierna potliwość w obrębie pach

#### **Przeciwwskazania:**

Ciąża, okres karmienia piersią. Wiek poniżej 16 roku życia. Nie stosować kremu na uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować u osób, u których wystąpiły objawy uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu (skład na opakowaniu).

#### **Działania niepożądane:**

Świąd, rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z objawów, preparat należy zmyć wodą z dodatkiem mydła i skontaktować się z lekarzem.

#### **Zastosowanie:**

Emulsję należy nakładać na czystą, suchą skórę, na noc. Rano należy preparat zmyć wodą z dodatkiem mydła. Stosować przez 2-4 dni (zawsze na noc) a następnie 2-3 razy w tygodniu.

#### **Dostępne opakowanie:**

Rillo emulsja opakowanie roll-on, pojemność 50 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.



## BASE MATT krem 50 ml

### **Właściwości i działanie:**

Base Matt krem to unikalna kompozycja składników matująco-nawilżających, pozwalająca uzyskać efekt świeżości przez długi czas – niezależnie od Twojego zmęczenia.

### **Zastosowanie:**

Krem Base Matt można stosować jako krem matujący na dzień lub jako doskonałą bazę pod codzienny makijaż. Nakładać cienką warstwę kremu na suchą, stonizowaną skórę.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników

### **Dostępne opakowanie:**

Krem Base Matt tuba o zawartości 50 ml



## SQUAMAX krem 100 ml

SQUAMAX krem to preparat zawierający łącznie kwas salicylowy i mocznik. Skutecznie usuwa objawy nadmiernego rogowacenia skóry ułatwiając oddziaływanie leków. Jest niezwykle komfortowy w zastosowaniu: nie powoduje nadmiernego przetłuszczenia, łatwo zmywalny wodą z dodatkiem szamponu lub mydła.

### SQUAMAX krem zawiera:

- kwas salicylowy 5% - zapewnia działanie złuszczące pogrubiałej warstwy rogowej naskórka
- mocznik 20% - silnie nawilża, zwiększa elastyczność warstwy rogowej naskórka
- substancje pomocnicze - stabilizują właściwe natłuszczenie i nawilżenie skóry

### SQUAMAX krem wskazania:

- łuszczyca
- łupież
- łojotokowe zapalenie skóry w fazie nadmiernego łuszczenia
- wyprysk z hyperkeratozą

### Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na kwas salicylowy, mocznik lub pozostałe składniki emulsji, ciąża, okres karmienia piersią, wiek poniżej 12 roku życia, niewydolność nerek lub wątroby. Nie stosować w przypadku bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych zakażeń skóry. Nie stosować kremu na błony śluzowe, wargi, okolice moczowo-płciowe, do oczu i na skórę w okolicy oczu.

### SQUAMAX krem sposób użycia:

Nakładać na suchą skórę 1 raz dziennie na 2-4 godziny. Po zmyciu ciepłą wodą z dodatkiem mydła można stosować inne preparaty. Zabieg powtarzać przez kilka dni. Sposób użycia może być modyfikowany przez lekarza. W razie podrażnienia należy skontaktować się z lekarzem.

### Dostępne opakowanie:

SQUAMAX krem - tuba o zawartości 100 ml

Przed zastosowaniem preparatu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.