Zorac® - Retinoid
Tazarotene Pierre Fabre Dermatologie żel: (0,5 mg/g) tuba 15 g (Rp) PP żel: (1 mg/g) tuba 15 g (Rp) PP Skład: 1 g żelu zawiera 0,5 mg lub 1 mg tazarotenu.

Działanie:
Pochodna retinoidowa, prolek ulegający w organizmie enzymatycznej deestryfikacji do postaci czynnej - kwasu karboksylowego tazarotenu. W badaniach na myszach wykazano, że hamuje on indukcję naskórkowej dekarboksylazy ornitynowej, odpowiedzialnej m.in. za proliferację i przerost komórek w przebiegu łuszczycy, oraz rozlu źnia
poł ą
czenia między korneocytami, hamuj
ą
c proces rogowacenia. Także w hodowlach ludzkich keratynocytów tazaroten zmniejsza szybko
ś
ć procesu rogowacenia. Po zastosowaniu preparatu pod opatrunkiem okluzyjnym jego wchłanianie przez skórę wynosi do 5%, przy czym zwi
ą
zek macierzysty osi
ą
ga niewielkie stężenia we krwi; nieco większe stężenia uzyskuje jego metabolit. Jest on wi
ą
zany z białkami osocza w ponad 99%. T0,5 wynosi około 18 h. Tazaroten i jego czynny metabolit s
ą
wydalane z moczem i kałem w postaci sulfonowych i sulfotlenkowych metabolitów.

Wskazania:
Miejscowe leczenie przewlekłej łuszczycy plackowatej ze zmianami skórnymi, nie przekraczają cymi 20% powierzchni ciała (żel 0,05% i 0,1%). Miejscowe leczenie tr
ą
dziku pospolitego o łagodnym i umiarkowanym przebiegu (żel 0,1%).

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na tazaroten lub pozostałe składniki preparatu. Ciąża. Dzieci poniżej 12 r.ż.

Środki ostrożności:
Nie należy stosować na skórę zdrową. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania tazarotenu na obszar skóry przekraczaj ący 20% powierzchni ciała.
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, powiekami i ustami oraz stosowania w obrębie fałdów skórnych. Ostrożnie stosować w skojarzeniu z lekami, mog
ą
cymi wywołać fotonadwrażliwo
ś
ć. Ci
ą
ża i okres karmienia piersi
ą
: Ze względu na teratogenne i embriotoksyczne działanie u zwierz
ą
t nie należy stosować tazarotenu w ci
ą
ży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny w trakcie leczenia preparatem stosować skuteczn
ą
antykoncepcję. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersi
ą
.

Działania niepożądane:
U pacjentów z łuszczycą najczęściej obserwowano reakcje miejscowe w postaci świądu, pieczenia, rumienia, nasilenia zmian łuszczycowych, podrażnienia i bólu. Rzadziej występowała wysypka, nadmierne łuszczenie, wyprysk kontaktowy niealergiczny, zapalenie, pękanie, krwawienie i sucho
ś
ć skóry. Podczas leczenia u niektórych pacjentów, pocz
ą
wszy od 4. miesi
ą
ca terapii, występowało zaostrzenie zmian łuszczycowych i rumień posłoneczny, przy czym działania niepoż
ą
dane występowały czę
ś
ciej po zastosowaniu żelu 0,1%. U pacjentów z tr
ą
dzikiem najczę
ś
ciej obserwowano nadmierne łuszczenie, pieczenie, sucho
ś
ć skóry, rumień,
ś
wi

ą
d; rzadziej - podrażnienie, ból, pękanie skóry, odbarwienia. Nadmierne podrażnienie skóry jest wskazaniem do odstawienia preparatu. Interakcje: Równoczesne stosowanie leków i kosmetyków o działaniu drażni
ą
cym lub silnie wysuszaj
ą
cym skórę nasila ryzyko działań niepoż
ą
danych (nie stosować ł
ą
cznie).

Dawkowanie:
Cienką warstwę żelu (2 mg/cm3) nanosi się raz dziennie na umytą i dokładnie osuszoną skórę zmienion
ą
chorobowo (w tr
ą
dziku zaleca się stosować preparat wieczorem). Uwagi: Podczas leczenia należy unikać nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV. Czas stosowania w badaniach klinicznych wynosił: u pacjentów z łuszczyc
ą
- do 12 miesięcy; u pacjentów z tr
ą
dzikiem - do 12 tyg.

{jcomments off}